

Un corps étranger empêche la victime de respirer. Elle ne peut plus parler, crier, tousser, elle s'agite, devient bleue et peut perdre connaissance.

1 à 5 claques vigoureuses dans le dos.



Pour la victime qui peut tenir sur l'avant-bras du sauveteur.



Si ce n'est pas efficace: 1 à 5 compressions abdominales ou thoraciques chez l'adulte obèse ou la femme enceinte.





Pour la victime qui peut tenir sur la cuisse du sauveteur.



dans le dos





compressions thoraciques

Alerter et surveiller.

La victime se plaint de malaise

La victime répond qu'elle ne se sent pas bien.

Observer les signes de l'accident cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral qui nécessitent une prise en charge urgente.

Et les autres signes :

douleur abdominale intense. difficulté à parler ou à respirer, sensation de froid, sueurs, pâleur.

Mettre la victime au repos.

Se renseigner sur son état de santé.

Appeler le 15:

- transmettre les informations,
- répondre aux questions,
- suivre les consignes.

Surveiller.



Position assise si difficulté respiratoire

La victime présente un traumatisme

En cas de choc, coup, chute, faux mouvement.

Empêcher de bouger la zone atteinte.

Alerter et surveiller.

La victime présente une plaie

Plaie simple: se laver les mains, nettoyer la plaie à l'eau courante avec ou sans savon, éventuellement désinfecter, protéger par un pansement, vérifier la vaccination antitétanique et surveiller.

Plaie grave: l'installer en position d'attente, ne pas retirer le corps étranger.



Plaie au thorax: position assise

Plaie abdominale: position allongée, jambes fléchies

Plaie à l'œil: position allongée, yeux fermés, sans bouger la tête

Dans tous les autres cas, position allongée.

Alerter les secours. Surveiller la victime.

La victime présente une brûlure

Refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau tempérée, au plus tard, dans les 30 minutes suivant la brûlure.

Si la brûlure est grave, alerter les secours et appliquer les consignes.

Ensemble, pour former aux gestes d'urgence



NUMÉROS D'URGENCE:

Un message clair:

- le numéro de téléphone,
- la nature du problème et la localisation très précise de l'événement,
- répondre aux questions,
- appliquer les consignes et raccrocher sur les instructions de l'opérateur.

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) Tous acteurs de la sécurité civile











La victime présente une hémorragie

La conduite à tenir

La perte de sang prolongée ne s'arrête pas spontanément :

- arrêter l'hémorragie,
- allonger la victime,
- faire alerter ou alerter les secours,
- parler régulièrement à la victime en attendant les secours,
- protéger la victime contre la chaleur, le froid ou les intempéries,
- surveiller la victime.

Les techniques



Comprimer l'endroit qui saigne, main protégée, si possible



ou à l'aide d'un pansement compressif

Si inefficace ou impossible

réaliser un garrot improvisé « tourniquet ».

Mettre en place le lien au-dessus de la plaie qui saigne.





Serrer le garrot en tournant la barre jusqu'à l'arrêt du saignement

En l'absence de barre, serrer le nœud le plus fortement possible et réaliser un double nœud de maintien



Réactivez vos connaissances : www.youtube.com/apprendre2

MAIF - Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9 Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 € entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681 - CS 20000 - 79076 Niort cedex 9 - Entreprises régies par le Code des assurances. 7127GPS/04/2017 - Studio de création MAIF - Illustrations : Laurent RUILLIER/comillus.com

La victime a perdu connaissance

La victime est en arrêt cardiaque

La victime ne répond à aucune sollicitation

Pas de réponse à la parole, ni aux ordres.

Libérer les voies aériennes

Basculer la tête en arrière et relever le menton.



Apprécier la respiration

Regarder, écouter, sentir pendant 10 secondes maximum.



La victime respire

Mettre la victime en position latérale de sécurité (PLS)









Alerter et surveiller la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

La victime ne respire pas ou présente une respiration anormale

Faire alerter ou alerter les secours et demander un défibrillateur







Adulte

Enfant

Bébé

30 compressions thoraciques, 100 à 120/min, suivies de 2 insufflations. Répéter ces cycles.



Position neutre pour le bébé



Chez l'adulte, l'enfant et le bébé, mettre en œuvre le défibrillateur dès son arrivée et suivre les consignes.





Alerte et protection des populations

Renseignez vous www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC www.gouvernement.fr/risques

ré-RCS Niort:

Alerte et protection des population

LER/comillus.com